

# FICHE DE RENSEIGNEMENT 19

## APTITUDE AU TRANSPORT

### PORCS APTES AU TRANSPORT

Les porcs aptes sont en pleine forme. Quelques conditions limitées peuvent permettre de transporter des porcs sans mesures spéciales comme par exemple :

#### Hernie mineure

- Pas de plaie ouverte, ni d'ulcération ou d'infection apparente
- N'amène pas le porc à montrer des signes de douleur ou de souffrance
- Ne touche pas le sol
- Ne gêne pas le mouvement (Les membres arrière ne touchent pas la hernie quand le porc marche)
- Ne ballote pas lorsque le porc marche (Moins de 15 cm de diamètre)

#### Petits porcs

- Pas émacié
- Pas de fièvre
- Non fragilisé ou non inapte en raison d'une autre condition

(Une bonne pratique est de regrouper les petits porcs ensemble dans un même compartiment)

#### Morsures de queue mineures

- Plaie mineure, n'est pas beaucoup enflée et n'amène pas le porc à montrer des signes de douleur ou de souffrance

#### Mesures spéciales incluent:

- Les expédier à l'endroit approprié le plus proche (pas un parc de rassemblement ni un encan)
- Les alimenter, les abreuver et les laisser se reposer au moins toutes les 12 heures
- Les isoler dans un compartiment de la remorque, seuls ou avec un autre porc compatible
- Les embarquer et débarquer individuellement sans qu'ils n'aient à utiliser de rampes à l'intérieur de la remorque
- Fournir des mesures additionnelles visant à assurer leur bien-être comme par exemple une litière supplémentaire ou les embarquer en dernier et les débarquer en premier

### PORCS FRAGILISÉS APTES AU TRANSPORT AVEC MESURES SPÉCIALES \*

#### Blessures ou plaies

- Blessure aiguë au pénis
- Engelure aiguë
- Prolapse rectal ou vaginal (frais ou réparé, qui n'est pas inflammé, mordu, déchiré ni très enflé)
- Une morsure de queue non guérie, enflée mais n'amène pas le porc à montrer des signes de douleur ou de souffrance

#### État de santé

- Castration non guérie
- Respiration laborieuse
- Aveugle des deux yeux
- Léger ballonnement, sans signe d'inconfort ou de faiblesse
- Boiteux ou infirme depuis la naissance (sans signe de douleur)
- Truie en pic de lactation, avec mamelles engorgées ou enflées qui entraîneront de la douleur durant le transport

#### Boiterie

- Peut se lever et marcher sans aide sur ses quatre pattes
- Démarche imparfaite (ex. toute boiterie) mais il n'hésite pas à marcher et ne montre pas des mouvements saccadés

#### Hernie modérée

- Plus de 15 cm de diamètre et ballote lorsque le porc marche (décrochée)

### PORCS INAPTES AU TRANSPORT \*

Les porcs fiévreux ou qui montrent des signes de douleur ou de souffrance ne doivent pas être jamais transportés.

#### Hernie sévère

- Avec plaie ouverte, une ulcération ou de l'infection apparente
- Qui amène le porc à montrer des signes de douleur et de souffrance
- Touche le sol
- Gêne les mouvements (ex. entre en contact avec un membre arrière lorsqu'il marche)

#### Boiterie

- Incapable de se lever ou de se tenir debout sans aide
- Incapacité à mettre son poids sur une patte pour marcher
- Mouvements saccadés ou hésitant à marcher (montre des signes de douleur et de souffrance)

\*Les conditions « inaptes » prévalent toujours sur les conditions « fragilisées »

#### Plaies et blessures

##### (incluant les morsures de queue)

- Plaie saignant abondamment
- Plaie qui occasionne des souffrances
- Plaie qui empêche le porc de marcher sans aide
- Plaie qui entraîne de la détresse ou de l'épuisement
- Porc mourant ou en état de choc
- Fractures qui affectent la mobilité
- Prolapse utérin
- Prolapse rectal ou vaginal sévère (inflammé, mordu, déchiré ou très enflé)

#### État de santé

- Signes de fièvre (temp. au-delà de 40°C)
- Très maigre (émacié)
- Respiration laborieuse, épuisement ou détresse
- Signes de déshydratation, d'épuisement, d'hypothermie ou d'hyperthermie
- Syndrome du porc stressé (tremble, a de la difficulté à respirer et/ou a une peau décolorée)
- Ballonnement avec des signes d'inconfort ou de faiblesse
- Truie en fin de gestation (> 100 jours)
- Truie ayant mis bas au cours des dernières 48 heures

Cette affiche énumère la plupart, mais pas la totalité, des conditions qui pourraient rendre un porc fragilisé ou inapte. Pour plus de renseignements, communiquez avec votre organisation provinciale d'éleveurs de porcs ou votre bureau local de l'ACIA ou visitez [inspection.gc.ca/sanscruaute](https://inspection.gc.ca/sanscruaute)

## RECOMMANDATIONS À LA FERME

Voici les recommandations à respecter correspondant à la démarche à suivre dans l'organisation du transport des animaux fragilisés pour optimiser le travail de tous les intervenants.

**Durant l'élevage, l'éleveur doit :**

- Dépister tôt les cas problèmes
- Isoler et traiter les porcs le plus vite possible
- Décider d'expédier l'animal avant qu'il ne soit plus transportable
- Euthanasier rapidement les animaux qui ne répondent pas aux traitements

**Avant l'expédition, l'éleveur doit :**

- Aviser le transporteur lors de la planification du voyage à l'abattoir
- Montrer le porc fragilisé au transporteur ou l'aviser AVANT de commencer à charger
- Ne jamais essayer de cacher à son transporteur la condition d'un animal à risque

**Le transporteur doit :**

- Évaluer si le porc sera apte à débarquer seul sur ses quatre pattes à destination
- Ne pas charger un porc fragilisé si son état est susceptible de s'aggraver suite au transport
- Prendre la décision finale d'embarquer ou non l'animal fragilisé
- Isoler les animaux fragilisés dans un compartiment convenable (maximum de 2 porcs)
- Transporter directement un animal fragilisé à l'abattoir SANS PASSER par un encan ou un parc de rassemblement



Ce projet est financé sous le programme Agri-assurance du Partenariat canadien pour l'agriculture, une initiative fédérale-provinciale-territoriale