

Si vous développez votre propre version, elle doit comprendre toutes les exigences. NIS :	
Gestionnaire du site : Personne responsable :	

Les bonnes pratiques de production ci-dessous servent à minimiser le stress et l'impact sur la santé et le bien-être des porcelets nouvellement sevrés. Repérez celles qui s'appliquent à votre ferme.

## **PROTOCOLE**

		rsonnes responsables doivent suivre ce protocole pendant trois à cinq jours rivée et la prise en charge des porcs nouvellement sevrés.	S'applique à la ferme	Importance				
1.		gestionnaire du site doit s'assurer que les personnes responsables ppliquer ce protocole sont adéquatement formées.		Obligatoire				
2.	Préparation de la pouponnière							
	a.	Nettoyer la pouponnière entre les lots conformément à la POS 2.2.1 Hygiène des bâtiments.						
	b.	S'assurer que les parcs de la pouponnière ont eu le temps de sécher avant d'y loger les porcelets.		Fortement recommandé				
	C.	Avant d'amener les porcelets dans une pièce, s'assurer que celle-ci ait atteint une température ambiante adéquate.						
	d.	Autres bonnes pratiques de production :						
3.	Po	sitionnement des porcs						
	a.	Placer les porcs de même âge et de taille semblable dans le même parc.		Fortement recommandé				
	b.	Prévoir un espace supplémentaire adéquat pour loger les porcs malades ou les radets.						
	C.	Lorsque le taux d'agressivité initial diminue (habituellement dans les deux à trois jours), ne pas introduire de nouveaux porcs dans un parc.						
	d.	Ne pas déplacer les porcs dans d'autres parcs (sauf vers un parc pour porcs malades, au besoin).						
	e.	Utiliser des méthodes de manipulation à faible niveau de stress lors du déplacement ou de la manipulation des porcs.						
	f.	Autres bonnes pratiques de production :						

[7-7] 1 **MODULE 7** PARTIE 7.7

Les dès	pe l'a	rsonnes responsables doivent suivre ce protocole pendant trois à cinq jours rrivée et la prise en charge des porcs nouvellement sevrés.	S'applique à la ferme	Importance				
4.	Gestion des aliments et de l'eau							
	a.	S'assurer que les abreuvoirs fonctionnent bien et qu'ils se trouvent à la bonne hauteur.						
	b.	Ajuster les distributeurs d'aliments de sorte qu'au moins 60 % de la mangeoire est recouverte d'aliments.						
	C.	Offrir les aliments dans des mangeoires ou sur des tapis propres.						
	d.	Distribuer des aliments frais au moins deux à trois fois par jour.		Fortement recommandé				
	e.	Songer à éclairer les pièces au cours des premières 24 à 48 heures pour permettre aux porcs de trouver leur nourriture plus facilement.		recommunae				
	f.	Identifier et marquer les porcs qui ne se sont pas nourris pour poursuivre leur surveillance.						
	g.	Autres bonnes pratiques de production :						
5.	Pra	atiques d'élevage quotidiennes	<u> </u>					
	a.	Faire la tournée des chambres plusieurs fois par jour au cours des 72 heures après le sevrage.						
	b.	Surveiller la qualité de l'air.						
	c.	Noter la température ambiante et l'ajuster au besoin.						
	d.	Observer les porcs pour tout signe de refroidissement.						
	e.	Si des signes de refroidissement sont constatés, augmenter la température de la chambre ou ajouter un chauffage d'appoint comme des tapis chauffants.		Fortement recommandé				
	f.	Observer les porcs pour déceler d'autres problèmes, tels des signes de maladies ou de blessures.						
	g.	Isoler les radets et les porcs malades pour leur administrer un traitement, des soins particuliers et pour poursuivre leur surveillance.						
	h.	Autres bonnes pratiques de production :						

2