

Aiguilles et techniques d'injection

(Voir la section Fournitures médicales: utilisation et entreposage du Manuel du producteur.)

La plupart des producteurs élèveront des porcs pendant toute une vie sans briser une seule aiquille, mais il convient de signaler ici que ce problème peut survenir. Il faut déterminer les mesures à prendre pour éviter que cela se produise et décrire la marche à suivre si le problème survient.

La fesse (le jambon), qui constitue l'une des parties les plus en demande dans la carcasse du porc, est habituellement vendue en entier. Les cicatrices dues aux injections peuvent produire des morceaux croquants et un abcès au point d'injection ou encore un kyste qui peuvent ne pas être détectés avant que le consommateur ne commence à découper la viande. Depuis plusieurs années maintenant, on incite les producteurs à donner des injections intramusculaires dans le cou du porc. Si des complications liées au point d'injection surviennent à cet endroit, il sera facile d'effectuer un parage minimal dans cette partie de moins grande valeur pour régler le problème avant que la viande n'arrive chez le consommateur.

| 12. | Est-ce que les injections intramusculaires sont données seulement dans les muscles du cou de vos porcs? (Voir la portion sur les Techniques d'injection pour les porcs dans la section Fournitures médicales: utilisation et entre-posage du Manuel du producteur ou l'affiche disponible auprès de l'agence |
|-----|--|
| | provinciale responsable de l'application du programme AQC |

Non O

Oui O

| Toute injection intramusculaire doit être administrée dans les muscles du cou du porc. Vous |
|---|
| devez savoir que si vous faites l'injection ailleurs que dans le cou, votre ferme ne pourra être |
| accréditée par le programme. La recommandation de votre accréditation sera retardée d'un |
| délai qui variera selon le type d'animaux impliqués. S'il s'agit de porcs de finition, vous pour- |
| riez avoir à attendre jusqu'à six mois après avoir corrigé votre méthode d'injection. S'il s'agit |
| de sujets reproducteurs, vous et votre valideur devrez déterminer un délai après le changement |
| votre technique d'injection. Votre valideur ou l'agence provinciale responsable de l'application |
| du programme AOC™ vous donnera de plus amples renseignements. |





13a) Décrivez les mesures prises à la ferme pour réduire le risque d'une aiguille

| Vous trouvez peut-être que cette question ne vous concerne pas, puisque cassé d'aiguille de seringue. En fait, rares sont les éleveurs qui en brisent. Que question vise à faire ressortir les mesures que vous prenez pour réduire ce Vous prenez sans doute déjà beaucoup de précautions pour éviter de bris exemple, la méthode appropriée d'injection et de contention de l'animal, quent des aiguilles et l'élimination immédiate des aiguilles pliées. En réportion, pensez aux choses que vous faites déjà et jetez un coup d'œil à la su médicales: utilisation et entreposage pour obtenir des idées sur les choses répondre à cette question. | uoi qu'il en soit, cette risque au maximum. ser les aiguilles: par le changement fré- ondant à cette ques- ection <i>Fournitures</i> |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |





13b) Décrivez les mesures prises à votre ferme pour minimiser le risque d'abcès au point d'injection.

(Pensez aux éléments suivants: définir une dose maximale par point d'injection, des protocoles indiquant la longueur et le calibre de l'aiguille à utiliser, une politique concernant le nettoyage et l'entretien des seringues.)

Les abcès au point d'injection ont deux causes principales: la saleté de la peau du porc et des instruments, et l'excès de médicaments au même endroit. Certains de ces abcès peuvent passer inaperçus lorsque vous inspectez vos porcs. D'autres au contraire sont très évidents. Les abcès non détectés peuvent faire autant de dégâts que ceux que vous voyez et soignez. Les abcès entraînent des pertes lors du parage pour l'enlèvement des parties atteintes (lisez vos manuels!). De plus, si les abcès sont logés profondément dans un grand muscle, on peut ne les apercevoir qu'à la transformation... ou dans l'assiette du consommateur. C'est en partie pour éviter les abcès au point d'injection que le programme AQC™ exige l'injection dans le cou. Parmi les précautions à connaître, il y a la technique d'injection appropriée (qui comprend l'injection dans une peau propre), la voie d'injection adéquate et l'entreposage correct des médicaments (pas d'aiguilles laissées dans les capuchons!). Vous trouverez d'autres suggestions dans la section Fournitures médicales: utilisation et entreposage du Manuel du producteur. Vous pouvez aussi discuter du sujet avec votre vétérinaire.



13c) Comment procédez-vous pour vous assurer que les politiques mises en place sont effectivement respectées?

| comment controlez-vous cette partie de votre système de production? Comment formez-vo votre personnel? Faites-vous un suivi de cette formation? Pensez aux mesures de suivi (surv lance) que vous prenez pour réduire le plus possible le risque d'abcès et d'aiguilles brisée Quels registres gardez-vous? Le contrôle des abcès et des aiguilles cassées est un point de contrôle critique du programme AQC™. Il faut noter les cas d'aiguilles brisées dans les registre des traitements. Si vous utilisez le même formulaire de prise de notes que celui du programme souvenez-vous qu'il n'est pas nécessaire de noter les aiguilles non brisées. Cependant, on de enregistrer qu'il y a eu abcès lorsqu'un animal est soigné pour cette raison. Qu'envisageriez-voir faire si le nombre ou la fréquence des abcès augmentait dans votre ferme? Comment feries vous face à la situation avec votre personnel si les bris d'aiguilles et les abcès étaient en hauss | | |
|---|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



14. Que feriez-vous si une aiguille se brisait et si elle restait à l'intérieur du porc après une injection?

| Nous l'avons dit, il est possible que vous ne cassiez jamais d'aiguille de seringue. Mais si cela arrivait, que feriez-vous? Il faut mentionner les cas d'aiguilles cassées dans le Registre des traitements. Peut-on extraire l'aiguille cassée? Comment identifieriez-vous l'animal en question? Qui informeriez-vous à votre agence de mise en marché ou à votre abattoir? Votre province ou votre abattoir ont-ils une politique d'identification des porcs suspects? Considérez ces aspects en répondant à cette question. |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |