

**POS 7.10 EUTHANASIE****★ POINT CRITIQUE**

NIS : .....

Gestionnaire du site : ..... Personne responsable : .....

**IDENTIFICATION DU VÉTÉRINAIRE DÉTENTEUR D'UN DROIT DE PRATIQUE**

Cette POS d'euthanasie a été mis au point en consultation avec un vétérinaire détenteur d'un droit de pratique avec qui une relation vétérinaire-client-patient est présente.

Nom du vétérinaire : .....

**PROTOCOLE**

Les membres du personnel responsables doivent suivre ce protocole chaque fois qu'un porc est euthanasié.	S'applique à la ferme	Importance											
1. Le gestionnaire du site doit s'assurer que les personnes responsables d'appliquer ce protocole sont adéquatement formées	<input type="checkbox"/>	Obligatoire											
<p><b>LISTE DES PERSONNES FORMÉES POUR EUTHANASIER DES PORCS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nom</th> <th>Stade de production</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Nom		Stade de production										
Nom	Stade de production												
2. Entretien de l'équipement servant à l'euthanasie													
a. L'équipement utilisé pour euthanasier les porcs est nettoyé et entretenu après s'en être servi et avant d'être entreposé, de sorte qu'il soit en bon état de fonctionnement lorsqu'il devra être utilisé à nouveau.	<input type="checkbox"/>	Fortement recommandé											
b. <i>Autres bonnes pratiques de production :</i> ..... .....	<input type="checkbox"/>												

Les membres du personnel responsables doivent suivre ce protocole chaque fois qu'un porc est euthanasié.		S'applique à la ferme	Importance																											
<b>3. Préparation à l'euthanasie</b>																														
a. Contenir les animaux qui devront être euthanasiés au besoin.	<input type="checkbox"/>	Fortement recommandé																												
b. Si le déplacement des porcs risque d'entraîner de la douleur et de la souffrance, il faudra les euthanasier là où ils se trouvent. i. Les porcs ne doivent pas être trainés, poussés, forcés à se déplacer sur des pattes cassées ou lorsque le mouvement entraîne douleur et souffrance.	<input type="checkbox"/>	Obligatoire																												
c. <i>Autres bonnes pratiques de production :</i> _____ _____	<input type="checkbox"/>	Fortement recommandé																												
<b>4. Méthodes d'euthanasie</b>																														
a. Euthanasier rapidement les animaux qui doivent l'être et selon les méthodes répertoriées ci-dessous :		<input type="checkbox"/>	Obligatoire																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Catégories de porcs (poids)</th> <th>Méthode d'euthanasie principale<sup>1</sup></th> <th>Méthode d'euthanasie de rechange<sup>2</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exemple : truies et verrats</td> <td>pistolet à tige</td> <td>arme à feu</td> </tr> <tr> <td>Porcelets sous la mère (moins de 2,3 kg)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Porcelets sous la mère/porcelets en pouponnière (2,3 à 9 kg)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Porcelets en pouponnière/sevrés (9 à 32 kg)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Porcs en croissance (32 à 68 kg)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Porcs en engraissement (68 à 120 kg)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cochettes/truies/verrats<sup>3</sup> (120 à 200 kg)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Truies/verrats<sup>3</sup> (plus de 200 kg)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Catégories de porcs (poids)			Méthode d'euthanasie principale <sup>1</sup>	Méthode d'euthanasie de rechange <sup>2</sup>	Exemple : truies et verrats	pistolet à tige	arme à feu	Porcelets sous la mère (moins de 2,3 kg)			Porcelets sous la mère/porcelets en pouponnière (2,3 à 9 kg)			Porcelets en pouponnière/sevrés (9 à 32 kg)			Porcs en croissance (32 à 68 kg)			Porcs en engraissement (68 à 120 kg)			Cochettes/truies/verrats <sup>3</sup> (120 à 200 kg)			Truies/verrats <sup>3</sup> (plus de 200 kg)			
Catégories de porcs (poids)	Méthode d'euthanasie principale <sup>1</sup>			Méthode d'euthanasie de rechange <sup>2</sup>																										
Exemple : truies et verrats	pistolet à tige			arme à feu																										
Porcelets sous la mère (moins de 2,3 kg)																														
Porcelets sous la mère/porcelets en pouponnière (2,3 à 9 kg)																														
Porcelets en pouponnière/sevrés (9 à 32 kg)																														
Porcs en croissance (32 à 68 kg)																														
Porcs en engraissement (68 à 120 kg)																														
Cochettes/truies/verrats <sup>3</sup> (120 à 200 kg)																														
Truies/verrats <sup>3</sup> (plus de 200 kg)																														
<sup>1</sup> Se reporter à la fiche de renseignements F-18 Méthodes d'euthanasie pour déterminer la méthode d'euthanasie qui est adéquate.																														
<sup>2</sup> La méthode principale et la méthode de rechange peuvent être la même.																														
<sup>3</sup> Lors de l'utilisation d'un pistolet à tige, les porcs d'un poids de $\geq 120$ kg requièrent une méthode d'euthanasie de rechange (i.e. réappliquer le pistolet à tige, la saignée ou la décérébration) dès que l'animal devient insensible.																														

Les membres du personnel responsables doivent doit suivre ce protocole chaque fois qu'un porc est euthanasié.	S'applique à la ferme	Importance
b. <i>Autres bonnes pratiques de production</i> : _____ _____	<input type="checkbox"/>	Fortement recommandé
<b>5. Confirmation de l'insensibilité</b>		
a. Évaluer l'insensibilité du porc tout de suite après l'utilisation de la méthode d'euthanasie.  i. <i>Méthodes utilisées pour évaluer l'insensibilité</i> : _____ (Exemples : réflexe du nerf cornéen (toucher l'oeil), piqûre sur le nez, observation de contraction musculaire suivie de pagayage, absence de respiration, n'essaie pas de se lever.)	<input type="checkbox"/>	Obligatoire
b. Si le porc présente des signes de retour de la sensibilité, réappliquer immédiatement la mesure d'euthanasie principale ou la mesure de rechange et confirmer l'insensibilité.  Si le porc est toujours vivant, mais insensible, attendre que la mort survienne ou appliquer une méthode secondaire (p. ex., saignée ou décérébration) pour confirmer le décès avant de déplacer le porc ou de le laisser sur place.  i. <i>Autres méthodes pour confirmer le décès</i> : _____ _____	<input type="checkbox"/>	
c. <i>Autres bonnes pratiques de production</i> : _____ _____	<input type="checkbox"/>	Fortement recommandé
<b>6. Confirmation du décès</b>		
a. Confirmer le décès dans les cinq minutes après avoir confirmé l'insensibilité, et avant de déplacer le porc ou de le laisser sur place.  Pour confirmer le décès, tous les indices suivants doivent être présents : i. Pupilles fixes et dilatés. ii. Insensible (consulter les méthodes pour confirmer l'insensibilité). iii. Absence de mouvement. iv. Absence de respiration.	<input type="checkbox"/>	Obligatoire
b. Documentez les porcs euthanasiés dans le Registre des mortalités (R-M).	<input type="checkbox"/>	Obligatoire
c. <i>Autres bonnes pratiques de production</i> : _____ _____	<input type="checkbox"/>	Fortement recommandé

---

## REGISTRE

Nom du registre		Importance
R-M	Registre des mortalités	Obligatoire