

**Clinique Vétérinaire  
Demeter**

845, route Marie-Victorin,  
local 38  
St-Nicolas (Qc) G7A 3S8

Tél. : 418-836-0744  
Sans frais : 1-877-847-5411  
Télec. : 418-836-0581

info@cliniquedemeter.com  
www.cliniquedemeter.com

# Protocole

## Collecte de fluides oraux



Canadian Swine  
Health Board  
Conseil canadien  
de la santé porcine

Ce projet a été financé dans le cadre du  
*Programme de biosécurité et de stabilisation  
sanitaire des entreprises porcines du Québec*,  
une initiative du Conseil canadien de la santé  
porcine. Le financement est rendu possible grâce  
à Agriculture et Agroalimentaire Canada.

[www.santeporcine.ca](http://www.santeporcine.ca)

Mise à jour : novembre 2010

### Matériel nécessaire :

- Corde 100% coton
- Corde de polypropylène (corde à ballot)
- Sac(s) Ziploc (un par échantillon)
- Couteau ou ciseau propre
- Tube(s) d'échantillonnage (Vacutainer)
- Crayon marqueur
- Crochets au besoin



(1) Attacher la corde de coton (36 pouces de long) à la corde de polypropylène. Le nœud doit être assez serré pour que la corde de coton ne glisse pas et tombe sur le plancher.



(2) Attacher la corde de polypropylène à un support solide au plafond; un support vissé à une poutrelle de bois est suffisant. S'il n'y a pas de support, visser un crochet à une poutrelle. **La corde doit être installée le plus loin possible des sources d'eau et de nourriture.**



(3) Ajuster la hauteur de la corde de coton à l'épaule des animaux. La corde **ne doit pas toucher au plancher.**



(4) Laisser les animaux mâchouiller la corde pour environ 20 à 30 minutes (plus longtemps pour les petits cochons). **Ne pas laisser les animaux détruire la corde!**



(5) Utiliser des **gants propres** pour prendre la corde contenant la salive. S'il y a plus d'un échantillon à collecter, **changer de gants entre les échantillons.**



(6) Placer la **portion humide** de la corde dans un sac Ziploc propre et **presser la corde pour en faire ressortir le liquide imbibé.**

**Clinique Vétérinaire  
Demeter**

845, route Marie-Victorin,  
local 38  
St-Nicolas (Qc) G7A 3S8

Tél. : 418-836-0744  
Sans frais : 1-877-847-5411  
Télec. : 418-836-0581

info@cliniquedemeter.com  
www.cliniquedemeter.com

# Protocole

## Collecte de fluides oraux



Canadian Swine  
Health Board  
Conseil canadien  
de la santé porcine

Ce projet a été financé dans le cadre du  
*Programme de biosécurité et de stabilisation  
sanitaire des entreprises porcines du Québec*,  
une initiative du Conseil canadien de la santé  
porcine. Le financement est rendu possible grâce  
à Agriculture et Agroalimentaire Canada.

[www.santeporcine.ca](http://www.santeporcine.ca)

Mise à jour : novembre 2010



(7) Couper un coin du sac  
avec un ciseau ou un  
couteau propre.



(8) Verser le liquide dans  
le tube d'échantillonnage.



(9) Identifier le tube  
correctement.



(10) Placer le tube dans un  
sac Ziploc propre et  
**réfrigérer** le plus vite  
possible. Contacter votre  
vétérinaire pour  
l'expédition des  
échantillons au laboratoire.